



**Protectorband (small/medium)**  
**Protectorband (large)**

DIERGEHEESMIDDEL VRIJ

**SAMENSTELLING**

Een witte halsband van 48 cm bevat: *Werkzaam bestanddeel*: Deltamethrin 0,760 g  
*Hulpstof*: Titaniumdioxide (E171) 0,285 g

Een witte halsband van 65 cm bevat: *Werkzaam bestanddeel*: Deltamethrin 1,000 g  
*Hulpstof*: Titaniumdioxide (E171) 0,375 g

**DOELDIER**

Hond.

**INDICATIES**

- Bestrijding van infestaties met teken (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) gedurende 5 tot 6 maanden.
- Bestrijding van bloedzuigen door phlebotome zandvliegen (*Phlebotomus perniciosus*) gedurende 5 tot 6 maanden.
- Anti-feeding effect op volwassen muggen (*Culex pipiens pipiens*) gedurende 6 maanden.

**CONTRA-INDICATIES**

- Niet gebruiken bij puppies jonger dan 7 weken.
- Niet gebruiken bij honden met huidlaesies.
- Niet gebruiken bij dieren met een bekende overgevoeligheid voor pyrethroiden.
- Niet gebruiken bij katten.

**DOSERING EN TOEDIENING**

De 48 cm lange halsband is voor gebruik bij kleine en middelgrote honden. De 65 cm lange halsband is voor gebruik bij grote honden. Eén halsband per hond. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Verwijder de halsband uit het dichtgesealde beschermzakje en breng het losjes rond de hals van de hond aan. Houd 2 platte vingers ruimte tussen de band en de hals van de hond. Haal het einde door de gesp en knip de resterende band af op 5 cm van de gesp. Knip bij puppies de band minder kort af, zodat deze bij groei verstelbaar blijft en controleer regelmatig of de band niet te strak komt te zitten. De band dient continu gedragen te worden.

**BIJWERKINGEN**

In zeldzame gevallen kunnen lokale huidlaesies, lokale dermatitis of erytheem, jeuk en haaruitval waargenomen worden. In zeer zeldzame gevallen zijn neurologische verschijnselen zoals tremor en lethargie gemeld. Indien dit optreedt dient de band afgedaan te worden. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Er kan alleen symptomatische behandeling plaatsvinden, omdat er geen specifiek antidoot bekend is. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

**WAARSCHUWINGEN**

- In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teken zich toch vasthechten ondanks het dragen van de band. Onder ongunstige omstandigheden kan de overbrenging van infectieuze ziekten door teken of zandvliegen daarom niet volledig worden uitgesloten.
- In geval van huidlaesies de halsband verwijderen tot de symptomen verdwenen zijn.

- Aangezien de halsband na een week de optimale werking bereikt dient de halsband bij voorkeur 1 week voordat de dieren mogelijk blootgesteld worden aan infestatie aangebracht te worden.
- Na het omdoen van de halsband de handen goed wassen met koud water en zeep.
- Product niet gebruiken bij allergie voor trifenyfosfaat.
  - Voorkom dat kinderen, met name kinderen jonger dan 2 jaar, de band aanraken, ermee spelen of in hun mond stoppen. Men moet ervoor zorgen dat jonge kinderen geen intensief contact hebben, zoals slapen, met honden die een band dragen.
- De halsband in het dichtgesealde zakje bewaren in het kartonnen doosje.
- Hoewel de werking van de halsband niet vermindert als deze af en toe in contact komt met water dient de halsband verwijderd te worden voordat de hond gaat zwemmen of wordt gewassen, omdat de actieve stof schadelijk is voor vissen en andere waterorganismen. Men moet voorkomen dat de hond gaat zwemmen gedurende de eerste 5 dagen dat de hond de halsband draagt.
- Kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.
- Niet gebruiken in combinatie met andere ectoparasiticiden die organofosfaten bevatten.
- In het onwaarschijnlijke geval dat de hond de halsband opeet, kunnen de volgende symptomen optreden: ongecoördineerde bewegingen, trillen, kwijlen, braken, stijfheid van de achterhand.

Deze symptomen verdwijnen gewoonlijk binnen 48 uur. Indien nodig kan symptomatisch behandeld worden met diazepam.

#### **BEWARING**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. De halsband in het dichtgesealde zakje in het kartonnen doosje bewaren. Bewaren beneden 25°C. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het doosje en het zakje.

#### **VERWIJDERING**

Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu. Dit diergeneesmiddel is schadelijk voor vissen, andere waterorganismen en bijen. Het product of de verpakking dient niet in de waterloop terecht te komen.

#### **VERPAKKING**

Kartonnen doosje met een halsband van 48 of 65 cm.

#### **OVERIG**

Deltamethrin is een ectoparasiticum voor toepassing op de huid. Het behoort tot de groep van de synthetische pyrethroiden. Insecten en teekachtigen worden door contact blootgesteld aan deltamethrin. Het werkingsmechanisme is gebaseerd op een aanhoudende verhoging van de natrium permeabiliteit van de zenuwmembranen van het insect. Dit resulteert in hyperactiviteit gevolgd door paralyse (shock effect), tremor en de dood van de parasiet. Deltamethrin komt continu vrij uit de halsband in de vacht en in het vetlaagje dat de huid bedekt. Het werkzame bestanddeel verspreidt zich van de plaats van direct contact over het hele huidoppervlak via de lipiden en het haar. Deltamethrin wordt niet systemisch geabsorbeerd door de hond.

Scalibor® Protectorband (small/medium): REG NL 9979 VRIJ  
 Scalibor® Protectorband (large): REG NL 9980 VRIJ

November 2011

Intervet Nederland B.V.  
 Postbus 50  
 5830 AB Boxmeer  
Een product van:  
 Intervet Productions S.A.

